

ロタウイルスワクチン（定期予防接種）のお知らせ

【ロタウイルス胃腸炎とは】

口から侵入したロタウイルスが腸管に感染して発症します。感染力が非常に強く下痢や嘔吐が頻回になるため、脱水症状を起こす場合があります。一生のうちに何度も感染しますが、初めてロタウイルスに感染した時は特に重症化しやすく、まれに脳や腎臓に影響をおよぼすことがありますので注意が必要です。

【ロタウイルスワクチンの種類】

ロタウイルスワクチンは飲むワクチンです。2種類のワクチンがありますが効果や安全性に差はありません。原則として途中でワクチンの種類を変更することはできません。

※初回は生後2か月から出生14週6日までに接種します。

	ロタリックス(1価)	ロタテック(5価)
ワクチン	生ワクチン 1.5ml/回 経口接種	生ワクチン2ml/回 経口接種
接種回数	2回(27日以上の間隔を空ける)	3回(27日以上の間隔を空ける)
対象年齢	生後6週～24週	生後6週～32週
接種間隔	27日(4週間)以上	27日(4週間)以上

*指定医療機関（裏面）に予約の上、母子健康手帳、石岡市の予診票をご持参ください。

*週数の数え方：出生日の翌日を出生1日後として算出します。

例) 出生 6週0日後：生まれてから6回目の生まれた日と同じ曜日

出生14週6日後：生まれてから15回目の生まれた日と同じ曜日の1日前

出生24週0日後：生まれてから24回目の生まれた日と同じ曜日

出生32週0日後：生まれてから32回目の生まれた日と同じ曜日

【異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔】

注射生ワクチン（BCG・麻しん風しん・水痘）を接種した日から異なる注射生ワクチンを行うまでの間隔は、27日以上あけてください。

【ロタウイルスワクチンの副反応】

主な副反応は、下痢・嘔吐・発熱などです。接種後1～2週間は腸重積症のリスクが高まる可能性があります。

【腸重積症について】

腸重積症とは腸が腸に入り込み閉塞状態となることです。接種後1～2週間程度の間に関次の症状が1つでも見られたときは、速やかに医師の診察を受けてください。

嘔吐を繰り返す 泣いたり不機嫌になったりを繰り返す 血便が出る ぐったりして元気がない

【問合せ先】

石岡保健センター 0299-24-1386

八郷保健センター 0299-43-6655

受付時間：月～金(祝日を除く)8:30～17:15

石岡市 ロタウイルスワクチン予防接種 指定医療機関(地区別50音順)

* 予防接種を受けるには予約が必要です。

* 接種当日は、「石岡市の予診票」「母子健康手帳」を忘れずに持って行きましょう。

医療機関名	所在地	電話番号
石 岡 市		
石岡第一病院	東府中1-7	0299-27-6161(*)
石岡ひかりクリニック	東大橋1898-5	0299-26-8055
柏木医院	石岡2158-3	0299-22-2874
ごとう内科	石岡1-14-1	0299-36-0510
山王台病院(第一クリニック)	東石岡4-1-38	0299-27-0860
関クリニック	府中3-1-6	0299-23-8300
芹澤医院	石岡3165-17	0299-22-2035
吉田小児科医院	旭台2-3-3	0299-28-0050
か す み が う ら 市		
酒井医院	央倉4468-1	029-897-1006
白井こどもクリニック	稲吉2-14-11	029-831-3803
大和医院	稲吉5-20-12	029-831-7937
高木医院	稲吉東1-15-1	029-832-2020
小 美 玉 市		
やまぐち医院	栗又四ヶ1747-10	0299-37-1055

* 石岡第一病院予防接種予約専用 9:00~11:00 14:00~16:00

上記以外の茨城県内指定医療機関でも接種ができます。詳しくは保健センターまたは接種を希望する医療機関へお問い合わせください。